

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **Форма выпуска**

Овальные таблетки в дозировке 400 мг. По 28 таблеток в упаковке.

### **Состав**

Одна таблетка содержит 400 мг Sofosbuvir.

### **Условия**

### **хранения**

Держите препарат в сухом, защищенном от солнца и недоступном для детей месте. Дата изготовления и срок хранения указаны на упаковке. Не принимайте препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Хранить препарат следует при температуре от 15 до 30° С.

### **Изготовитель**

Индийская фармацевтическая компания Natco Pharma, Ltd. Co. Изготовлено по лицензии фармацевтической компании Gilead.

## **Показания к применению**

Лекарство применяется для лечения хронического гепатита С у взрослых в комбинации с другими противовирусными препаратами.

## **Способ применения**

Препарат принимается один раз в сутки в дозировке 400 мг (1 таблетка). Таблетку лучше не разжевывать, так как она имеет насыщенный горький вкус. Лекарство лучше принимать во время еды, запивая обильным количеством воды. Принимайте препарат ежедневно, в одно и то же время.

## **Побочные действия**

В целом, препарат переносится хорошо и не имеет ярко выраженных побочных явлений. Самые распространенные из них – это усталость, головная боль и тошнота. Выраженность побочных эффектов возрастает при комбинированной терапии с интерфероном и другими противовирусными препаратами. С помощью данной таблицы вы сможете ознакомиться со всеми побочными эффектами, замеченными в ходе многочисленных испытаний.

Начав терапию Софосбувиром, внимательно следите за своим самочувствием. Докладывайте лечащему врачу о малейших отклонениях от нормы или побочных проявлениях.

## **Противопоказания**

### **Препарат нельзя принимать:**

- детям и подросткам до 18 лет;
- во время беременности;
- в период кормления грудью;

- при повышенной чувствительности к действующему веществу.

Указанным группам пациентов нельзя проходить терапию Софосбувиром, так как клинических испытаний для данных групп не проводилось. Женщины репродуктивного возраста должны принимать препарат с осторожностью, потому что на данный момент влияние Софосбувира на репродуктивные функции точно не установлено.

Пациенты пожилого возраста и пациенты с почечной и печеночной недостаточностью должны проходить лечение только под тщательным наблюдением врача. Для легкой степени почечной и печеночной недостаточности изменение дозировки не нужно.

## **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Препарат применяется в комбинации с другими противовирусными средствами только в том случае, когда эффективность превышает возможные осложнения. Препарат не следует комбинировать с Боцепревиром или Телапревиром. В терапевтической дозе 400 мг в сутки препарат не влияет на продолжительность интервала QT и не вызывает нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

## **Особые указания**

- лечение должно проводиться только под тщательным наблюдением доктора;
- лекарство рекомендуется принимать в комбинации с другими противовирусными препаратами;
- монотерапия Софосбувиром не рекомендуется;
- рекомендованная доза для взрослых – 400 мг в день (1 таблетка) во время еды;
- не снижайте суточную дозу препарата;
- лекарство имеет неприятный горький привкус, поэтому препарат лучше не разжевывать и не делить на части;
- если в течение двух часов после приема лекарства случилась рвота – примите дополнительную таблетку;
- если рвота случилась по истечению двух часов – дополнительная таблетка не требуется;
- когда прием препарата не состоялся по каким-либо причинам, сразу выпейте пропущенную таблетку. В следующий раз можно принимать таблетку в обычное время;
- во время лечения воздержитесь от видов деятельности, которые требуют скорости реакции и повышенного внимания.

**Заказать в интернет магазине Софосбувир,  
Даклатасвир, Ледипасвир Индия недорого Москва.  
Купить ледипасвир для лечения гепатита С. Тел  
7(926)096-36-22**

**Перейти на сайт**

гепатит.сф